



Publicação

Março, 2005 Ano 2 Número 15

retorna

Expediente

Download

**Campanha Nacional de Vacinação no Estado de São Paulo –  
1999 a 2004**

Divisão de Imunização/ NIVE/CVE-CCD/SES

Edições Anteriores

As campanhas nacionais de vacinação contra a influenza, direcionadas às pessoas com mais de 60 anos, foram iniciadas em 1999, em comemoração ao Ano Internacional do Idoso. Mais de 13 milhões de brasileiros foram beneficiados em 2004 com a vacina.

No Estado de São Paulo, cerca de 84% da população com 60 anos ou mais de idade foram vacinadas na primeira campanha (1999), com redução dos índices de cobertura vacinal entre 2000 e 2003 (média de 65%). Os motivos da redução na adesão à vacinação foram identificados com os resultados de duas pesquisas de opinião pública realizadas, em 2001 e 2002, pela Secretaria Estadual de Saúde. Apesar da baixa ocorrência de reações vacinais, este foi um dos principais motivos relatados pela população para não se vacinar (Bepa nº 4/2004).

Conhecendo melhor a opinião do grupo alvo da campanha sobre os motivos da não adesão, foi possível incrementar as informações técnicas junto aos profissionais de saúde e imprensa, na tentativa de melhor esclarecer à população que a vacina contra a influenza é pouco reatogênica e seus reais benefícios são: a prevenção das complicações decorrentes da infecção pelo vírus, a redução das hospitalizações e da mortalidade, principalmente em pessoas com doenças crônicas cardiovasculares, pulmonares e diabetes.

Em 2004, mais de 2,7 milhões de pessoas foram vacinadas, representando 78% da população na faixa etária acima de 60 anos. Apenas 39 municípios dentre os 645 no Estado, não atingiram mais de 70% dos seus cidadãos, situação bem melhor do que nos anos anteriores (figuras 1 A e 1 B).

**Figura 1A**

Cobertura vacinal por município, 2000 e 2004



Fonte: Divisão de Imunização/ NIVE/CVE-CCD/SES

**Figura 1B**

Cobertura vacinal por município, 2000 a 2004



Fonte: Divisão de Imunização/ NIVE/CVE-CCD/SES

Além da utilização em idosos no período da campanha, a vacina contra influenza é utilizada em grupos populacionais de maior risco:


- Pessoas com doenças crônicas cardiovasculares, pulmonares, renais, metabólicas (diabetes mellitus) e hepáticas.
- Imunodeprimidos (transplantados, com neoplasias, infectados pelo HIV).

Também são vacinados os profissionais de saúde (principalmente os que convivem com pessoas nas situações anteriores), com o objetivo de reduzir a transmissão da doença para os pacientes.

Os dados registrados de doses aplicadas na rotina apontam para o aumento gradual destas ações, superando em 2004 o total de 700.000 doses (figura 2).

**Figura 2**

Vacina contra influenza - doses aplicadas na rotina (grupo de risco) e idosos pós período de campanha, Estado de São Paulo, 2001 a 2004




Fonte: Divisão de Imunização/ Nive/CVE-CCD/SES

Durante as campanhas, aproveitando a mobilização da população e equipes de saúde, também são aplicadas as vacinas contra o pneumococo (pessoas institucionalizadas e grupos de risco), difteria e tétano.

Mais de 500.000 doses da vacina contra o pneumococo foram aplicadas entre 1999 e 2004, sendo 76% destas na população com mais de 60 anos (figura 3). A vacina contra o pneumococo, integrante do elenco de imunobiológicos especiais, disponibilizados em Centros de Referência, tem indicações especificadas pelo Ministério da Saúde (informações no *site* [www.cve.saude.sp.gov.br/html/imuni/unid\\_imunobi.htm](http://www.cve.saude.sp.gov.br/html/imuni/unid_imunobi.htm)).

**Figura 3**

Vacina contra o pneumococo - doses aplicadas por faixa etária, 1999 a 2004




Fonte: Divisão de Imunização/ Nive/CVE-CCD/SES

Para a proteção contra o tétano é necessária a aplicação de três doses, com intervalos adequados, e, entre 1999 a 2004, foi possível completar o esquema de 38% da população de idosos (figura 4), com impacto na redução da incidência da doença nesta faixa etária neste período (Bepa nº 13 /2005).

**Figura 4**

Vacina dupla adulto, Estado de São Paulo, doses aplicadas (3ª d. e reforços) e cobertura vacinal em 60 anos ou +, 1999 a 2004



Fonte: Divisão de Imunização/ Nive/CVE-CCD/SES

No período de 25 de abril a 6 de maio deste ano, em todo o País, será realizada novamente a vacinação contra influenza da população com 60 anos ou mais de idade, pelo sexto ano consecutivo. O êxito poderá ser repetido, contando com o compromisso dos agentes envolvidos: profissionais de saúde, comunidades científicas e organizações sociais representativas dos idosos.

**Para esta campanha será utilizada a vacina do Instituto Butantan, que, segundo as recomendações da OMS, contém:**

- **A/New Caledonia/ 2007/99 (H1N1)**
- **A /Wellington/1/2004 (H3N2)**
- **B/Shanghai/361/2002 (análogo a B/Jilin/20/2003 e B/Jiangsu/10/2003).**

Coordenadoria de Controle de Doenças

*Bepa - Av. Dr. Arnaldo, 351 - 1º andar, s. 131  
Tels.: (11) 3066-8823 / 3066-8825  
e-mail: bepa-agencia@saude.sp.gov.br*