



Publicação

Expediente

Bibliografia

Gráficos

Novembro, 2004 Ano 1 Número 11

[retorna](#)

Atualização do Calendário Vacinal do Estado de São Paulo

*Flávia Helena Ciccone, Telma Regina Marques P. Carvalhanas¹,
Helena K. Sato, Clélia Maria S. Aranda²*

¹*Divisão de Doenças de Transmissão Respiratória*

²*Divisão de Imunização*

Centro de Vigilância Epidemiológica "Professor Alexandre Vranjac" – CVE

Tendo em vista a inclusão da 2ª dose da vacina Tríplice Viral - SCR (contra o sarampo, caxumba e rubéola) no calendário de vacinação da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, houve necessidade de adequar as medidas de controle do sarampo, rubéola e caxumba. Essa 2ª dose foi introduzida após a Campanha de Vacinação de Seguimento contra o Sarampo realizada em agosto de 2004.

Nesse sentido, a Divisão de Doenças de Transmissão Respiratória e a Divisão de Imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE- SES/SP) estão elaborando, com base na normatização atual, um informe técnico sobre a atualização das atividades de vacinação desses agravos.

As atividades referem-se ao bloqueio vacinal dos contatos dos casos suspeitos de doenças exantemáticas, a operação limpeza para os casos IgM reagente para sarampo e vacinação em surtos de caxumba. O referido informe será disponibilizado oportunamente no site do CVE com divulgação no Boletim Epidemiológico Paulista. (Bepa).

Considerando o êxito das ações do Plano de Erradicação do Sarampo em toda a Região das Américas e o risco de importação do vírus do sarampo de países onde a doença ainda é endêmica, é de suma importância a manutenção de uma vigilância ativa e sensível com a detecção dos casos suspeitos de sarampo e rubéola.

Destaca-se, ainda, que o envolvimento de todos os profissionais de saúde é fundamental para a notificação e investigação oportuna de todos os casos suspeitos, com o desencadeamento rápido das estratégias de vigilância, vacinação e laboratório, com vistas ao efetivo controle destes agravos no Estado.

Calendário de Vacinação para o Estado de São Paulo - 2004

| IDADE | VACINAS |
|------------------------|-----------------|
| A partir do nascimento | BCG, HEPATITE B |
| | |

| | |
|---------------|---|
| 2 MESES | POLIOMIELITE, HEPATITE B*, TETRAVALENTE (DTP+Hib) |
| 4 MESES | POLIOMIELITE, TETRAVALENTE (DTP+Hib) |
| 6 MESES | POLIOMIELITE, HEPATITE B**, TETRAVALENTE (DTP+Hib) |
| 9 MESES | FEBRE AMARELA*** |
| 12 MESES | SARAMPO-CAXUMBA-RUBÉOLA (SCR) |
| 15 MESES | DPT, POLIOMIELITE |
| 5 OU 6 ANOS | DPT, POLIOMIELITE, SCR**** |
| 15 ANOS ***** | dT |

* O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda doses da vacina contra a hepatite B é de 30 (trinta) dias.

** O intervalo entre a segunda e terceira dose é de dois meses, desde que o intervalo de tempo decorrido da primeira dose seja, no mínimo, de quatro meses e a criança já tenha completado 6 meses de idade.

*** Nas regiões onde houver indicação, de acordo com a situação epidemiológica. Reforço a cada dez anos.

**** A partir da Campanha Nacional de Seguimento contra o sarampo - set./04, está sendo incluída a 2ª dose da SCR.

***** Reforço a cada dez anos por toda a vida. Em caso de gravidez e na profilaxia do tétano após alguns tipos de ferimentos, deve-se reduzir este intervalo para cinco anos.

BCG: vacina contra a tuberculose

DPT: vacina contra a difteria, a coqueluche e o tétano

dT: vacina dupla, tipo adulto, contra a difteria e o tétano

SCR: vacina contra o sarampo, caxumba e rubéola

Agência Paulista de Controle de Doenças

Bepa - Av. Dr. Arnaldo, 351 - 12º andar, s. 1.218

Tels.: (11) 3066-8823 / 3066-8824

e-mail: bepa-agencia@saude.sp.gov.br