

Eliminação da Hanseníase no Brasil / Brazilian Leprosy Elimination

Dra. Maria Leide de Oliveira


Coordenadora da Divisão de Dermatologia
Sanitária do Ministério da Saúde


Os dados abaixo apresentam a redução da prevalência, que após a assinatura do pacto de eliminação em 1991, foi de 60%*, decorrência das altas por cura. Contudo, evidenciam o aumento da detecção de casos novos em mais de 100% (estima-se que serão diagnosticados cerca de 45.000 casos novos anuais até o ano 2000). Mantendo-se a redução anual de 20-25% da prevalência estima-se que se chegue ao ano 2000 com o coeficiente de 2.75 doentes/10.000 habitantes. Se o Brasil atingir essa redução irá influenciar a obtenção da meta no continente americano até o ano 2000.

Elimination target achievement

Considering the annual reduction of 20-25% of the prevalence rate, it is expected that by the year 2000, the prevalence rate of leprosy in Brazil will be around 2.7/10.000 inhabitants. However, the elimination target could be achieved if the WHO criteria for calculating prevalence indicator is adopted 1. Also the shortening of MDT duration will be a favorable factor.

Even though the whole country will not reach the WHO target by the year 2000, about 10 states could reach it (up to target); as well as hundreds of municipalities. Even with the rate of 2.7/10.000, the impact on the American continent will be enough to achieve the WHO target for the continent by the year 2000.





* Coeficientes estimados

FONTE: CENSOCENEPI/RS/MS