

*José Antônio Garbino**

CARTA AO EDITOR

Foram selecionados cinco resumos apresentados no VIII Simpósio Nacional de Eletromiografia de 2011, realizado no Instituto Internacional de Ciências Sociais (IICS), São Paulo. Os Módulos referentes à Polineuropatia apresentam alguma relação com a neuropatia da hanseníase. Dois deles são trabalhos técnicos. Neste apresentou-se a técnica e resultados da condução nervosa sensitiva no nervo cutâneo lateral sural ou da sura e um estudo anatômico do túnel do tarso em cadáveres. Os nervos cutâneos e os nervos nos túneis são sítios comuns de acometimento dessa doença. Uma série de três casos de neuropatia amiloide foi selecionada por ser uma neuropatia na qual o comprometimento sensitivo é marcante e com consequentes deficiências similares a hanseníase. Um Caso Clínico sobre neuropatia ulnar atípica com obvio interesse no diagnóstico diferencial da hanseníase neural primária. E, finalmente, um Resumo que traça um paralelo entre duas neuropatias desmielinizantes crônicas a neuropatia da hanseníase e a polirradiculoneurite crônica.

* Médico Fisiatra – Responsável pelo Programa de Ensino em Neurofisiologia Clínica do Instituto Lauro de Souza Lima, Bauru, SP.